

전문의약품

디톡시온 주

[글루타티온(환원형)]

■ 원료약품 및 그 분량 : 1바이알 중

유효성분 : 글루타티온(환원형)(KP) 600mg
첨가제(안정제) : 탄산수소나트륨 적량

■ 성 상 : 흰색~유백색의 다공성의 동결 건조된 내용물이 충전된 바이알 주사제

■ 효능·효과 : 시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방

■ 용법·용량 : 중증의 경우 1일 600~1200mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다.

수일에 걸쳐 치료하는 경우 또는 경미한 경우에는 1일 300~600mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 이상반응

- 1) 아나필락시양 증상 : 드물게 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면창백, 혈압 저하, 맥박이상 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통이 나타날 수 있다.

2. 적응상의 주의

- 1) 조제시 : 바이알 제제는 용해 후 즉시 사용한다.
- 2) 근육주사하는 경우에는 신경 및 혈관을 피하여 신중히 투여한다. 또, 반복투여의 필요성이 있는 경우에는 좌우를 바꾸어 주사하는 등 동일부위를 피하고 유·소아에는 특히 주의한다.

3. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 10바이알

● 이 첨부문서 작성일자 2020년 12월 3일 이후 변경된 내용은 **의약품통합정보시스템**(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 **동광홈페이지** : www.dkphm.com에서 확인할 수 있습니다.

● 의약품 사용 후 부작용 발생 시 **한국의약품안전관리원**(☎1644-6223)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

● 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

DK031220

동광제약주식회사

경기도 평택시 산단로 115

● 수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472

KGMP

적격업체제품

본 제품은 우수의약품
제조관리기준에 적합
하게 제조되었습니다.