

전문의약품

I.M. / I.V.

# 레드업주

## 히드록소코발라민

### ■ 원료약품 및 그 분량 : 1mL 중

유효성분 : 히드록소코발라민(USP) ..... 2.5mg

첨가제 : 주사용수(용제), 아세트산나트륨수화물, 아세트산무수물, 염화나트륨

### ■ 성 상 : 암적색의 액이 갈색 앰플에 들어있는 주사제

### ■ 효능 · 효과

비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈과 관련된 다발성신경염의 치료

### ■ 용법 · 용량

성인 : 히드록소코발라민으로서 1일 1회 5,000ug을 근육주사 또는 정맥주사한다.

임상적 반응에 따라 저용량으로 치료를 지속한다.

### ■ 사용상의 주의사항

#### 1. 경고

1) 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상담해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

#### 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 비타민 B12와 그 유사체에 과민증 환자

2) 약성종양 환자(조직발육에 대한 비타민 B12의 작용으로 세포의 증식속도가 증가하지만 그 위험율에 대한 자료는 확실하지 않다.)

3) 임부

#### 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

비타민 B12와 그 유사체의 투여후에 나타나는 면역성 과민증은 매우 드물게 치명적일 수 있으므로 토양성 알레르기(천식, 습진)를 나타내는 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

#### 4. 부작용

1) 과민증 : 드물게 가려움증, 두드러기, 홍반, 일과성의 발진, 속 등이 일어날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

2) 피부 : 여드름이 생길 수 있다.

3) 기타 : 요의 착색이 나타날 수 있다.

#### 5. 적용상의 주의

근육주사시 동통을 일으킬 수 있다.

### ■ 저장방법 : 차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

### ■ 포장단위 : 50앰플[(2mL/앰플)×50]

● 이 첨부서 작성일자 2020년 4월 13일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 **동광홈페이지** : [www.dkphm.com](http://www.dkphm.com)에서 확인할 수 있습니다.

● 의약품 사용 후 부작용 발생 시 **한국약품안전관리원**(☎1644-6223)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

● 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

DK130420

**동광제약주식회사**

경기도 평택시 산단로 115

● 수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472

**KGMP**

적격업체제품

본 제품은 우수의약품  
제조관리기준에 적합  
하게 제조되었습니다.