

일반의약품



실루빈 연질캡슐

밀크시슬엑스 Silubin Soft Cap.

독성 간질환 Toxic liver disease
만성 간염 Chronic hepatitis
간경변 Liver cirrhosis

100 캡슐



일반의약품 정보	의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 드물게 위통 또는 설사, 2) 알레르기 반응
이 약을 사용하기 전 반드시 아래 내용을 확인하세요.	4. 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것, 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것, 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
【유효성분】 1캡슐 중 밀크시슬엑스(생규) 175mg (실리마린으로서 96.25mg)	5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것, 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것, 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
【효능·효과】 다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변	【저장 방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
【용법·용량】 성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회, 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회(또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회)복용한다.	【사용기한】 하단 표시일까지
【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것, 1) 심한 담도 폐쇄(췌개길 폐쇄) 환자 2) 이 약의 과민증 환자 3) 12세 이하의 소아 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 일부, 수유부 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 →	【첨가제】 ■ 첨가제 : 농글리세린, 소르비톨액(비결정성), 속산산젤라틴, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리옥실40경피마자유, 프로필렌글리콜 ■ 색상 : 갈색의 투명한 내용물을 함유하는 미황색(연노랑) 투명의 장방형 연질캡슐제 ■ 포장단위 : 100캡슐(5캡슐/PTP)×20

일반의약품



Silubin Soft Cap.

Milk-thistle Fruit Extract

실루빈 연질캡슐

Toxic liver disease
Chronic hepatitis
Liver cirrhosis

100 Capsules



실루빈 연질캡슐 밀크시슬엑스 Silubin Soft Cap.

독성 간질환 Toxic liver disease
만성 간염 Chronic hepatitis
간경변 Liver cirrhosis



Silubin Soft Cap.

Milk-thistle Fruit Extract
실루빈 연질캡슐

100 Capsules



- 본 제품은 흡습성이 우려되므로 PTP포장 상태로 보관할 것. **KGMP적격업체제품**
- 이 첨부문서 작성일자 2019년 1월 16일 이후 변경된 내용은 **온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)** 또는 **동광홈페이지 : www.dkphm.com**에서 확인할 수 있습니다.
- 제품 사용 후 부작용이 발생한 경우 한국약물관리안전관리원(☎1644-6223)에 부작용 피해 구제 신청을 할 수 있습니다.

● 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. **DK160119**

제조원/의사



경기도 평택시 산단로 115

제조사



충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

● 수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472

■ 제조번호 :
사용기한 :



8 806459 019318