

동광 알긴산나트륨액

(알긴산나트륨)

전문의약품

KGMP적격업체제품

■ **원료약품 및 그 분량** : 이 약 100mL 중 유효성분 : 알긴산나트륨(별규) ... 5g, 첨가제(보존제) : 메틸пара벤 ... 80mg, 프로필пара벤 ... 20mg, 기타 첨가제 : 살구향6337-B, 솔향1109, 수산화나트륨, 아세 설팜칼륨, 정제수, 카보머934P, 클로로필린구리나트륨착염 ■ **성상** : 알루미늄호일 파우치에 든 초록색의 점성이 있는 액제 ■ **효능·효과** : 1. 다음 질환의 지혈 및 자각증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 미란성위염 2. 역류성식도염의 자각증상 개선 3. 위 생검 출혈 시의 지혈 ■ **용법·용량** : 1. 위·십이지장궤양 및 미란성 위염의 지혈 및 자각증상 개선과 역류성 식도염의 자각증상 개선 : 알긴산나트륨으로서 보통 1회 1~3g(이 약 20~60mL)을 1일 3~4회 공복에 경구투여한다. 경구투여가 불가능한 경우에는 코 존데(sonde)를 이용한 경비 투여를 한다. 2. 위 생검 출혈 시의 지혈 : 이 약으로서 보통 1회 0.5~1.5g(이 약 10~30mL)을 내시경적으로 투여하고 1회 1.5g(이 약 30mL)을 경구 투여한다. ■ **사용상의 주의사항** : 1. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것 : 때때로 설사, 변비 등의 증상이 나타날 수 있다. 2. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 : 위산결핍증에서는 겔화(gelation)가 이루어지지 않아 이 약의 효과가 떨어진다. ■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 ■ **포장단위** : 40포/상자(25밀리리터/포)

- 이 첨부문서 작성일자 2024년 3월 15일 이후 변경된 내용은 **의약품통합정보시스템** (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 **동광홈페이지** : www.dkphm.com에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 **부작용 신고 및 피해구제 신청**은 **한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)**에 할 수 있습니다.
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효 기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- **수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472** DK150324

제조의뢰자  **동광제약주식회사**
경기도 평택시 산단로 115

제조사 **대원제약(주)**
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24